

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 866/1999 НА КОМИСИЯТА

от 26 април 1999 година

**относно разрешаване на нови добавки и нова употреба на добавки в храните
за животни**

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 70/524/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1970 г. относно добавките в храните за животни ¹, последно изменена с Директива 1999/20/ЕО ², и по-специално членове 3 и 9й от нея,

- (1) като има предвид, че Директива 70/524/ЕИО предвижда, че може да се разрешат нови добавки или нова употреба на разрешени добавки, вземайки под внимание напредъка в научно-техническото познание;
- (2) като има предвид, че Директива 93/113/ЕО на Съвета от 14 декември 1993 г. относно използването и търговията с ензими, микроорганизми и техните препарати при храненето на животни ³, последно изменена с Директива 97/40/ЕО⁴, чрез дерогация от Директива 70/524/ЕИО, даде право на държавите-членки да разрешат временно употребата и търговията с ензими, микроорганизми и техни препарати;
- (3) като има предвид, че проверката на досиетата, предоставени от държавите-членки съгласно член 3 от Директива 93/113/ЕО, показва, че определен брой препарати, които принадлежат към групите на ензимите и микроорганизмите могат да бъдат временно разрешени;
- (4) като има предвид, че Научният комитет по хранене на животните даде благоприятно становище по отношение на безвредността на тези препарати;
- (5) като има предвид, че предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Постоянния комитет по храните за животни,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Препаратите, които принадлежат към групата „ензими” и са изброени в приложение I към настоящия регламент, може да бъдат разрешени, съгласно Директива 70/524/ЕИО, като добавки при храненето на животните, при условията, посочени в споменатото приложение.

Член 2

¹ ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1.

² ОВ L 80, 25.3.1999 г., стр. 20.

³ ОВ L 334, 31.12.1993 г., стр. 17.

⁴ ОВ L 180, 9.7.1997 г., стр. 21.

Препаратите, които принадлежат към групата „микроорганизми” и са посочени в приложение II към настоящия регламент, може да бъдат разрешени, съгласно Директива 70/524/ЕИО, като добавки при храненето на животните, при условията, посочени в споменатото приложение.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в *Официален вестник на Европейските общности*.

Прилага се от 1 юли 1999 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 26 април 1999 година.

За Комисията:
Franz FISCHLER
Член на Комисията

ПРИЛОЖЕНИЕ I

№	Добавка	Химическа формула, описание	Вид или категория животни	Максимална възраст	Мин. Съдържание	Макс. Съдържание	Други условия	Период на разрешение
					Единици активност на kg готова храна за животни			
2	3-фитаза ЕО 3.1.3.8	Препарат на базата на 3-фитаза, получено от <i>Aspergillus oryzae</i> (DSM 10289), с минимална активност: - В обвивка: 2 500 FYT ⁽¹⁾ /g - Течна форма : 5 000 FYT /g	Кокошки - носачки	-	500 FYT	1 000 FYT	1. В указанията за използване на добавката и премикса, посочете температурата на съхранение, допустимата продължителност на съхранение, както и устойчивостта на гранулиране 2. Препоръчителна доза за kg готова храна за животни: 750 FYT 3. За употреба при комбинирани храни , богати на фитати, напр.съдържащи над 40% зърнени култури (царевица, ечемик, овес, пшеница, ръж, тритикал), маслодайни и бобови растения	30.9.1999 г.

8	Ендо-1,4-бета-глюканаза ЕО 3.2.1.4 Ендо-1,4-бета-ксиланаза ЕО 3.2.1.8	Препарат на базата на ендо-1,4-бета-глюканаза и ендо-1,4-бета-ксиланаза, получено от <i>Aspergillus niger</i> (CBS 600.94), с минимална активност на: Твърда и течна форми: Ендо-1,4-бета-глюканаза - 10 000 BGU ⁽²⁾ /g Ендо-1,4-бета-ксиланаза - 10 000 FXU ⁽³⁾ /g	Прасенца	Четири месеца	3000 BGU 1200 FXU	5000 BGU 2000 FXU	1. В указанията за използване на добавката и премикса, посочете температурата на съхранение, допустимата продължителност на съхранение, както и устойчивостта на гранулиране 2. Препоръчителна доза за kg готова храна за животни: 3 000 до 5 000 BGU 1 200 до 2 000 FXU 3. За употреба при комбинирани храни , богати на нескорбялни полизахариди (основно бетаглюкани и арабиноксилани), напр.съдържащи над 30% ечемик.	30.9.1999 г.
№	Добавка	Химическа формула, описание	Вид или категория животни	Максимална възраст	Мин. Съдържание	Макс. Съдържание	Други условия	Период на разрешение
				Единици активност на kg готова храна за животни				
29	Ендо-1,3(4)-бета-глюканаза ЕО 3.2.1.6	Препарат на базата на ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, получено от <i>Geosmithia emersonii</i> (IMI SD 133), с минимална активност: - 5 500 U ⁽⁴⁾ /g	Пилета за угодяване	-	250 U	-	1. В указанията за използване на добавката и премикса, посочете температурата на съхранение, допустимата продължителност на съхранение, както и устойчивост на гранулиране 2. Препоръчителна доза за kg готова храна за животни: 250 U 3. За употреба при комбинирани храни , богати на нескорбялни полизахариди (предимно бета-глюкани), напр.съдържащи над 50% ечемик	30.9.1999 г.

30	Ендо-1,3(4)-бета-глюканаза ЕО 3.2.1.6 Ендо-1,4-бета-ксиланаза ЕО 3.2.1.8	Препарат на базата на ендо-1,3(4)-бета-глюканаза и ендо-1,4-бета-ксиланаза, получено от <i>Penicillium funiculosum</i> (IMI SD 101), с минимална активност: Форма на прах: Ендо-1,3(4)-бета-глюканаза - 2 000 U ⁽⁵⁾ /g Ендо-1,4-бета-ксиланаза - 1 400 U ⁽⁶⁾ /g Течна форма: Ендо-1,3(4)-бета-глюканаза - 500 U /ml Ендо-1,4-бета-ксиланаза - 350 U /ml	Пилета за угодяване	-	Ендо-1,3(4)-бета-глюканаза 100 U Ендо-1,4-бета-ксиланаза: 70 U	-	1. В указанията за използване на добавката и премикса, посочете температурата на съхранение, допустимата продължителност на съхранение, както и устойчивост на гранулиране 2. Препоръчителна доза за kg готова храна за животни: Ендо-1,3(4)-бета-глюканаза: 100 U Ендо-1,4-бета-ксиланаза: 70 U 3. За употреба при комбинирани храни , богати на нескорбялни полизахариди (основно бета-глюкани и арабиноксилани), напр.съдържащи над 50% ечемик или 60% пшеница	30.9.1999 г.
№	Добавка	Химическа формула, описание	Вид или категория животни	Максимална възраст	Мин. съдържание	Макс. съдържание	Други условия	Период на разрешение
					Единици активност на kg готова храна за животни			
31	Ендо-1,4-бета-ксиланаза ЕО 3.2.1.8	Препарат на базата на ендо-1,4-бета-ксиланаза, получено от <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (CBS 614-94), с минимална активност: Твърда форма: 300 EU ⁽⁷⁾ /g Течна форма: 1 000 EU /g	Пилета за угодяване	-	600 EU	-	1. В указанията за използване на добавката и премикса, посочете температурата на съхранение, допустимата продължителност на съхранение, както и устойчивост на гранулиране 2. Препоръчителна доза за kg готова храна за животни: 600 EU 3. За употреба при комбинирани храни , богати на нескорбялни полизахариди (основно арабиноксилани), напр.съдържащи над 60% пшеница	30.9.1999 г.

			Кокошки-носачки	-	300 EU	-	1. В указанията за използване на добавката и премикса, посочете температурата на съхранение, допустимата продължителност на съхранение, както и устойчивост на гранулиране 2. Препоръчителна доза за kg готова храна за животни: 600 EU 3. За употреба при комбинирани храни , богати на нескорбялни полизахариди (основно арабиноксилани), напр.съдържащи над 60% пшеница	30.9.1999 г.
--	--	--	-----------------	---	--------	---	--	--------------

- (1) 1FYT е количеството ензим, което освобождава един микромол неорганичен фосфат за минута, с Na-фитат като субстрат, при pH 5,5 и 37°C
- (2) 1BGU е количеството ензим, което освобождава 0,15 микромола глюкоза за минута от азурин-кръстосано свързан бета-глюкан при pH 5,0 и 40° C
- (3) 1FXU е количеството ензим, което освобождава 0,15 микромола ксилоза за минута от азурин-кръстосано свързан ксилан при pH 5,0 и 40° C
- (4) 1U е количеството ензим, което освобождава 2,78 микромола редуktivна захар (еквивалент на малтоза) от ечемичен бета-глюкан за минута при pH 5,0 и 50° C
- (5) 1U е количеството ензим, което освобождава 5,55 микромола редуktivна захар (еквивалент на малтоза) от ечемичен бета-глюкан за минута при pH 5,0 и 50° C
- (6) 1U е количеството ензим, което освобождава 4,00 микромола редуktivна захар (еквивалент на малтоза) от брезов ксилан за минута при pH 5,5 и 50° C
- (7) 1U е количеството ензим, което освобождава един микромол редуktivна захар (еквивалент на ксилоза) от овесен ксилан за минута при pH 4,5 и 40° C

ПРИЛОЖЕНИЕ II

№	Добавка	Химическа формула, описание	Вид или категория животни	Максима лна възраст	Мин. Съдържа ние	Макс. Съдържан ие	Други условия	Период на разрешение
					Брой единици, образуващи колонии (CFU) на kg готова храна за животни			
5	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> CBS 493.94	Препарат на базата на <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , съдържащ минимум 1 x 10 ⁸ CFU на g добавка	Говеда за угодяване	-	1,7 x 10 ⁸	1,7 x 10 ⁸	В указанията за използване на добавката и премикса, посочете температурата на съхранение, допустимата продължителност на съхранение, както и устойчивост на гранулиране Количеството на <i>Saccharomyces cerevisiae</i> в дневната дажба не трябва да превишава 7,5 x 10 ⁸ CFU на 100 kg живо тегло. Добавете 1 x 10 ⁸ CFU за всеки допълнителни 100 kg живо тегло	30.9.1999 г.
9	<i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM MA 18/5M	Препарат на базата на <i>Pediococcus acidilactici</i> , съдържащ минимум 1 x 10 ¹⁰ CFU на g добавка	Пилета за угодяване	-	1 x 10 ⁹	1 x 10 ¹⁰	В указанията за използване на добавката и премикса, посочете температурата на съхранение, допустимата продължителност на съхранение, както и устойчивост на гранулиране Може да се използва при комбинирани храни, съдържащи разрешените кокцидиостатици: ампролиум, метихлорпиндол, декоквинат, халофугинон, наразин, натриев салиномицин, никарбазин, мадурамицин амониум, диклазурил	30.9.1999 г.
			Прасенца	Четири месеца	1 x 10 ⁹	1 x 10 ⁹	В указанията за използване на добавката и премикса, посочете температурата на съхранение, допустимата продължителност на съхранение, както и устойчивостта на гранулиране	30.9.1999 г.
			Прасета	-	1 x 10 ⁹	1 x 10 ⁹	В указанията за използване на добавката и премикса, посочете температурата на съхранение, допустимата продължителност на съхранение, както и устойчивостта на гранулиране	

№	Добавка	Химическа формула, описание	Вид или категория животни	Максимал на възраст	Мин. Съдържан ие	Макс. Съдържан ие	Други условия	Период на разрешение
					Брой единици, образуващи колонии (CFU) на kg готова храна за животни			
10	Enterococcus faecium NCIMB 10415	Препарат на базата на Enterococcus faecium , съдържащ минимум Микрокапсули: 1,0 x 10 ¹⁰ CFU на g добавка 1,75x 10 ¹⁰ CFU на g добавка	Пилета за уговяване	-	0,3 x 10 ⁹	2,8 x 10 ⁹	В указанията за използване на добавката и премикса, посочете температурата на съхранение, допустимата продължителност на съхранение, както и устойчивостта на гранулиране Може да се използва при комбинирани храни, съдържащи разрешените кокцидиостатици: ампролиум, ампролиум/етопабат, диклазурил, халофугинон, мадурамицин амониум, метихлорпиндол, метихлорпиндол/метилбензокват, натриев монензин, робенидин, натриев салиномицин	30.9.1999 г.
			Прасета	-	0,35 x 10 ⁹	1,5 x 10 ⁹	В указанията за използване на добавката и премикса, посочете температурата на съхранение, допустимата продължителност на съхранение, и устойчивостта на гранулиране.	30.9.1999 г.
			Свине	-	0,2 x 10 ⁹	1,25 x 10 ⁹	В указанията за използване на добавката и премикса, посочете температурата на съхранение, допустимата продължителност на съхранение, и устойчивостта на гранулиране.	30.9.1999 г.
			Говеда за уговяване		0,25 x 10 ⁹	0,6 x 10 ⁹	В указанията за използване на добавката и премикса, посочете температурата на съхранение, допустимата продължителност на съхранение, и устойчивостта на гранулиране. Количеството Enterococcus faecium в дневната дажба не трябва да превишава 1 x 10 ⁹ CFU на 100 kg живо тегло. Добавете 1 x 10 ⁹ CFU за всеки допълнителни 100 kg живо тегло	30.9.1999 г.

№	Добавка	Химическа формула, описание	Вид или категория животни	Максимална възраст	Мин. Съдържа	Макс. Съдържа	Други условия	Период на разрешение
					Брой единици, образуващи колонии (CFU) на kg готова храна за животни			
		Препарат на базата на <i>Enterococcus faecium</i> , съдържащ минимум: Микрокапсули: 1,0 x 10 ¹⁰ CFU на g добавка 1,75x 10 ¹⁰ CFU на g добавка и Гранулирана форма: 3,5 x 10 ¹⁰ CFU на g добавка	Прасенца	Четири месеца	0,3 x 10 ⁹	1,4 x 10 ⁹	В указанията за използване на добавката и премикса, посочете температурата на съхранение, допустимата продължителност на съхранение, и устойчивостта на гранулиране. Гранулираната форма да се използва единствено при заместители на млякото	30.9.1999 г.
			Телета	Шест месеца	0,35 x 10 ⁹	6,6 x 10 ⁹	В указанията за използване на добавката и премикса, посочете температурата на съхранение, допустимата продължителност на съхранение, и устойчивостта на гранулиране. Гранулираната форма да се използва единствено при заместители на млякото	30.9.1999 г.
11	<i>Enterococcus faecium</i> DSM 5464	Препарат на базата на <i>Enterococcus faecium</i> , съдържащ минимум: 5 x 10 ¹⁰ CFU на g добавка	Прасенца	Четири месеца	0,5 x 10 ⁹	1 x 10 ⁹	В указанията за използване на добавката и премикса, посочете температурата на съхранение, допустимата продължителност на съхранение, и устойчивостта на гранулиране.	30.9.1999 г.